

بررسی حضور رونوشت‌های اختصاصی بیضه در اسپرم بالغ انسان

فریال اصلانی (M.Sc)^۱، محمدمهری آخوندی (Ph.D)^۲، محمدمهین مدرسی (M.D., Ph.D)^۳، اشرف شبانی (Ph.D)^۱، محمود اعرابی (M.D)^۲، محمدرضا صادقی (Ph.D)^۴

۱- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

۲- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل، پژوهشکده فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- این‌سینا، تهران، ایران.

۳- گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: انجام صحیح و کامل روند اسپرماتوزنز مستلزم بیان تعداد بسیار زیادی ژن به صورت همزمان و یا با توالی خاص خود می‌باشد؛ به طوری که توقف یا اختلال در بیان هر یک از آنها ممکن است منجر به توقف یا اختلال در روند اسپرماتوزنز گردد. شناسایی این قبیل ژنها و ارزیابی عملکرد آنها اطلاعات ارزشمندی درباره نقش این ژنها در اسپرم بالغ، روند اسپرماتوزنز و نیز عملکرد بعدی آنها در فرآیند لقاح و تکوین جنین و نیز درک اساس مولکولی فرآیند لقاح و یافتن علل بسیاری از انواع ناباروری بدون علت، فراهم می‌کند. جهت بررسی مراحل مختلف روند اسپرماتوزنز می‌توان از ژن‌هایی استفاده کرد که در مرحله و رده سلولی خاصی از این روند بیان می‌شود. در مطالعه حاضر بیان ژن‌های DAZ SYCP3، AKAP4 PRM2، TSGA10 PRM1 در اسپرم طبیعی انسان بررسی شد.

روش بررسی: نمونه مایع منی افراد دارای پارامترهای اسپرمی طبیعی (مطابق استانداردهای WHO) مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر این‌سینا، جمع‌آوری شد. اسپرم‌های متحرک با مرفوولوژی طبیعی طی مراحل سانتریفوژ شیب غلظت با استفاده از گرادیان Pure Sperm[®] از نمونه‌های مایع منی افراد نرم‌واسپرم جدا گردید. بیان ژن SYCP3 با روش Nested RT-PCR و بیان ژن‌های DAZ، PRM2، TSGA10 و PRM1 و AKAP4 با روش RT-PCR بررسی و با توجه به بیان ژن‌های فوق در بیضه طبیعی از بافت بیضه به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید.

نتایج: مطالعه روی cDNA حاصل از اسپرم‌های طبیعی نشان داد که ژن‌های DAZ، TSGA10، PRM2 و PRM1 در نمونه طبیعی بیضه (به عنوان کنترل) و در تمام نمونه‌های اسپرم تحت بررسی بیان می‌شوند. همچنین نتایج نشان داد که ژن‌های AKAP4 و SYCP3 در اسپرم بالغ بیان نمی‌شوند.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که رونوشت ژن‌های DAZ، PRM2، TSGA10 و PRM1 در اسپرم بالغ انسان حضور دارد. علت نگهداری انتخابی رونوشت‌ها و عدم حضور رونوشت‌هایی مانند AKAP4 و SYCP3 در اسپرم بالغ نمایانگر انتقال گروهی از رونوشت‌های پدری به تخمرک و نقش احتمالی آنها در مراحل بعدی عملکرد اسپرم می‌باشد. مطالعه و ردیابی این ژنها در مراحل اولیه تکوین جنین نتایج تازه‌ای از عملکرد این ژنها در فرآیند لقاح و تکوین جنین در اختیار قرار خواهد داد.

کلید واژگان: بیان ژن، ژنهای اختصاصی بیضه، اسپرماتوزنز، اسپرماتوزوآ.

مسئول مکاتبه: دکتر محمدرضا صادقی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل، پژوهشکده فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی- این‌سینا، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، صندوق پستی: ۱۹۶۱۵-۱۱۷۷، تهران، ایران.

پست الکترونیک: Sadeghi@avicenna.ac.ir

سایر سلولها انجام دهد. به نظر می‌رسد محتوای RNA ریبوزومی در طول بالغ شدن اسپرم شکسته و حذف می‌شود و مقادیری از mRNA به صورت انتخابی نگهداری می‌شود (۵).

Williams و Hecht در هسته اسپرم را نشان دادند (۶). حضور RNA در داخل هسته اسپرم بالغ با روش هیبریداسیون در محل^۲ توسط Pessot مجدداً گزارش شد (۷). Kumar و همکاران حضور mRNA ژن C-MYC را در اسپرم انسان در ناحیه میانی و دم اسپرم نشان دادند (۸). Miller و همکاران شواهدی مبنی بر حضور چندین mRNA شامل HSP70, B-actin, HSP90 و mRNA شامل Wykes و همکاران با استفاده از روش هیبریداسیون در محل حضور RNA در اطراف هسته سلول را مشخص کردند (۱۰).

ارزیابی اطلاعات با استفاده از Microarray نشان داده است که اسپرم بالغ انسان حدود ۵۰۰۰ نوع mRNA دارد که این تعداد در بین نمونه‌های مختلف ۱۰٪ تقvaوت دارد (۱۱). بسیاری از شواهد بر این نکته تاکید دارد که شاید انتقال این محتوای RNA به اووسیت به اندازه انتقال ژنوم هاپلوئید اهمیت داشته باشد و امروزه شواهدی مبنی بر انتقال برخی صفات پدری به فرزند از طریق همین رونوشتاهای موجود در اسپرم وجود دارد (۱۲). چنانچه این رونوشتاهای قابل تصور می‌شد تنها بقایای روند اسپرماتوژن هستند، در تمايز اولیه جنین نقش داشته باشند، این یافته‌ها می‌تواند در پیشبرد تکنولوژی انتقال هسته سلول سوماتیکی در کلونینگ و همچنین شناسایی عوامل موثر در ایجاد ناباروری مفید باشند (۱۳).

2- In Situ Hybridization

زمینه و هدف

اسپرم بالغ سلولی کاملاً تخصصی و تمایز یافته است که تاکنون تصور بر این بود که تنها نقش انتقال ژنوم پدری به تخمک را بر عهده دارد. در واقع با جایگزینی هیستونها با پروتامین‌های کوچک غنی از اسیدهای آمینه آرژینین، لیزین و سیستئین بیان ژن در هسته اسپرم به تدریج در طول اسپرمیوژن خاموش می‌شود و در نتیجه متراکم شدن ژنوم هاپلوئید تسهیل می‌گردد (۱).

امروزه با پیشرفت‌های شگرفی که در حوزه پژوهشی RNA مولکولی صورت گرفته است بررسی محتوای اسپرماتیدهای در حال رشد با استفاده از تکنیک‌هایی که بیان تعداد زیادی از ژنهای این مولکول را به طور همزمان بررسی می‌کنند مانند Northern Blot و Microarray امکان‌پذیر شده است. بسیاری از این ژنهای این‌های اختصاصی بیضه هستند (TSGA10, PRM1, PRM2, DAZ, SYCP3)؛ ولی برخی از این رونوشتاهای اختصاصی بافت بیضه نمی‌باشند و در سایر بافت‌ها و سلولها نیز بیان می‌شوند (مانند β-actin)، علاوه بر این تعدادی از رونوشتاهای غیر اختصاصی بیضه با اندازه‌های غیرمعمول از سایر بافت‌ها و یا واریانت‌هایی با طول و عملکرد متفاوت^۱ از ژنهای سوماتیکی در بافت بیضه یافت می‌شوند (۲). مطالعه این رونوشتاهای شناسایی مولکولی مراحل اسپرماتوژن، لقاح تخمک و مراحل اولیه تکوین جنین و نیز ارتباط ژنهای با فنوتیپ ناباروری مردان و نیز استفاده از آن در روش‌های تشخیصی، اهمیت دارد (۳).

شواهد جدید وجود ترجمه برخی از این رونوشتاهای موجود در اسپرم را به تناسب نیاز اسپرم بالغ تأیید می‌کنند (۴). با این وجود اسپرم بالغ حاوی مقادیر کافی RNA ریبوزومی ۱۸S و ۲۸S (و بنابراین کمپلکس ریبوزومی ۴۰S) نمی‌باشد تا فرآیند ترجمه را مشابه

1- Alternative splicing

سانتروزوم تعدادی از رونوشتاهای اسپرم در زمان لقاح به تخمک منتقل می‌شوند. زیرا بعد از لقاح تعدادی از این رونوشتاهای را در تخمک‌های بارور شده شناسایی کرده‌اند (۱۱، ۱۲). گزارش Rassoulzadegan و همکاران نشان داد که انتقال RNA اسپرم به تخمک، در نتیجه یک رویداد مستقل از منشاء سانتروزومی، صورت می‌گیرد (۱۷).

از طرف دیگر با توجه به طیف گستردگی علل ناباروری در مردان انجام تحقیقات سیستماتیک در مورد شناسایی علل آن بسیار دشوار است. با فرض اینکه RNA اسپرم تصویری کلی از پتانسیل اسپرماتوژنیک بیضه را مشخص می‌کند، می‌توان از این منبع برای تحقیقات ناباروری مردان استفاده کرد (۱۸).

در مطالعه حاضر بیان ژن‌های PRM1، PRM2، SYCP3، AKAP4، DAZ، TSGA10 (۱۹) برای اولین بار در اسپرم بالغ انسان بررسی شد که هر یک از این ژنها دارای نقش‌های اختصاصی در روند اسپرماتوژنیز و بیضه می‌باشند؛ زیرا روند طبیعی اسپرماتوژنیز ناشی از بیان متناسب گروهی از ژن‌های اختصاصی در سلول‌های اسپرماتوژنیک می‌باشد که برخی از آنها در تمامی مراحل و برخی در مراحل خاصی از روند اسپرماتوژنیز بیان می‌شوند. نتیجه فعالیت گروهی از این ژنها جفت شدن کروموزوم‌های هومولوگ، سیناپس و نوترکیبی و به‌دبیال آن جدا شدن کروماتیدهای خواهری ضروری می‌باشد که انجام صحیح این فرآیندها به کمک ساختارهای ویژه پروتئینی به نام پروتئین کمپلکس سیناپتونمال (SC)^۱ تنظیم می‌شود (۲۰).

در پستانداران پروتئین‌های SC شامل سه گروه SCP1 و SCP2 و SCP3 هستند که به نام SYCP3 خوانده می‌شوند. بیان SYCP3 منحصرأً در رده بلوغی سلول‌های ژرمنیال بیضه (در مرحله اسپرماتوسیت)

حضور RNA در اسپرم و در حقیقت وجود بیان ژن در این سلولها از بیش از ۳۰ سال قبل موضوع بحث بوده است. علاقه به این موضوع در ۵ سال اخیر بهدلیل گسترش فناوری‌های مولکولی مدرن و نیاز به ابداع روش‌های غیرتهاجمی برای مطالعه و بررسی عملکرد بیضه، مجدداً افزایش یافته است (۱۴). چنانچه اسپرم بتواند اطلاعات ارزشمندی از رویدادهای مولکولی داخل بیضه در اختیار بگذارد، در آن صورت نمونه مایع منی حاصل از یک روش غیرتهاجمی برای ارزیابی روند اسپرماتوژنیز در بیضه انتخابی بهتر و قابل قبول‌تر از بیوپسی خواهد بود. در واقع یکی از موارد اولیه استفاده RNA اسپرماتوژنومی استفاده از آن به عنوان یک مارکر مولکولی حساس و کاربردی جهت تعیین موقفيت واژکتومی در انسان بوده است. برای تعیین عدم وجود اسپرم مانند PRM-2 توصیه شده است (۱۵).

نظريه‌های متعددی درباره علت نگهداری برخی رونوشتاهای در گامت نر وجود دارد. در طی روند اسپرماتوژنیز پلهای سیتوپلاسمی که اسپرماتیدهای در حال تمایز را به یکدیگر متصل می‌کند، امکان تبادل محصولات ژنی در این سلولها را فراهم می‌کند. برخی از اسپرماتوسیتها و اسپرماتیدها ممکن است قادر رونوشتاهای ضروری مورد نیاز برای تکمیل فرآیندهای اسپرماتوژنیز و اسپرمیوژن باشند. این سلولها می‌توانند رونوشتاهای موردنیاز را از طریق سلول‌های مجاور تأمین کنند و روند اسپرماتوژنیز را تکمیل نمایند. می‌توان گفت که این تبادل ژنی تولید اسپرم طبیعی را افزایش می‌دهد (۱۶). سایر نظریه‌ها برخلاف این فرضیه هستند و نقش RNA برای خود اسپرم (احتمالاً نقش ساختاری) که متفاوت از نقش عملکردی RNA در سنتز پروتئین است و یا نقش ناشناخته RNA پس از انتقال به تخمک را عنوان می‌کند. شواهد موجود تأییدکننده آن است که علاوه بر

1- Synaptonemal Complex

(WHO) ، پس از انجام اسپرموگرام تشخیصی آنها جمع آوری شد. اسپرم‌های متحرک دارای مورفولوژی Nidacon، (Pure Sperm®) طبیعی با استفاده از (Sweden) طی مراحل سانتریفوژ شیب غلظت به صورت خالص از نمونه‌های مایع منی جدا سازی گردید. برای این منظور با افزودن محیط کشت Ham's F-10 Pure Sperm (Sigma, USA) (غلظت‌های ۴٪ و ۸٪) از تهیه گردید. سپس در یک لوله سانتریفوژ ابتدا ۲ ml Pure Sperm٪ ۴ از غلظت٪ ۰.۸ روى آن ۲ml از Pure Sperm٪ ۰.۸ روى آن ۲ml از غلظت٪ ۰.۴ اضافه شد. افزودن لایه‌ها به گونه‌ای انجام شد که دو لایه با هم مخلوط نشود. سپس روی آن ۲ml مایع منی اضافه و به مدت ۲۰ min با دور ۳۰۰ g با دقت و پس از آن اسپرم‌های رسوب کرده از لایه٪ ۸۰ با دقت و بدون مخلوط شدن با سایر لایه‌ها جدا گردید. پس از شستشوی اسپرمها با محیط کشت به آن حدود ۷ml از محلول Tel-Test Inc., USA (RNA-Bee) اضافه و برای استخراج RNA در ازت مایع (−۱۹۶ °C) به آزمایشگاه مولکولی منتقل گردید. نمونه بیوپسی بیضه طبیعی حاوی تمام رده‌های اسپرماتوژنی به عنوان کنترل مثبت استفاده شد.

استخراج RNA: RNA نمونه‌های اسپرم و بیضه با استفاده از Tel-Test Inc., USA (RNA-Bee) و طبق روش فنول-کلروفرم استخراج گردید (۲۷). نمونه‌های RNA تا زمان انجام آزمایش در −۷۰ °C- نگهداری شد. کیفیت RNA استخراج شده با تعیین نسبت A₂₆₀/A₂₈₀ ارزیابی گردید (۲<<۱/۷>>).

انجام RT-PCR: ابتدا ۱ μl از Total RNA حاوی RNA ۱۵۰ μg به مدت ۷ دقیقه در دمای ۶۵ °C گرفت تا اتصالات دو رشته‌ای RNA شکسته شوند. ۵X Reaction (Fermentase, EU) سپس به همراه (Roche, Germany) (10mM)dNTP ۲ μl Buffer Random hexamer (20mM) (Roche, Germany) و ۱ μl از آن Zymo RT (200U/μl) پر امترهای اسپرمی طبیعی (مطابق استانداردهای

انجام می‌گیرد. فقدان این ژن سبب اختلال در اسپرماتوژن و باروری فرد می‌شود (۲۱). ژن‌های DAZ گروهی از ژن‌های مستقر روی کروموزوم Y را تشکیل می‌دهند که در افراد مبتلا به آزواسپرمی حذف‌های متعددی در این نواحی دیده می‌شود. حداقل تجمع رونوشتاهای ژن DAZ در اسپرماتوسیت‌های اولیه گزارش شده که بیانگر آغاز رونویسی در مرحله A-Kinase Anchor (AKP4) Protein-4 (فراواترین پروتئین موجود در Fibrous sheath (ساختار اسکلت سلولی موجود در ناحیه ابتدایی تازک اسپرم) می‌باشد و تنها در مراحل بعد از میوز بیان می‌شود. در غیاب AKAP4 انتقال پیام و فعالیت آنزیم‌های گلیکولیتیک ارتباط خود را با Fibrous sheath از دست داده و در نتیجه حرکت اسپرم مختل می‌شود (۲۴). TSGA10 (در رویان، بیضه و بسیاری از انواع تومورهای سرطانی بیان می‌شود. شواهدی مبنی بر دخالت TSGA10 در تقسیم سلولی وجود دارد (۲۵). پروتئین TSGA10 در ناحیه Fibrous sheath اسپرم شناسایی شده است. علاوه بر این بیان این ژن در مراحل تمایز در جنین موش گزارش شده است (۲۶). با توجه به نقش گسترده این ژنها در روند اسپرماتوژن، ارزیابی وجود یا عدم وجود آنها در اسپرم بالغ mRNA اطلاعات ارزشمندی از عملکرد اسپرم و نقش آن در انجام این عملکرد در اختیار قرار خواهد داد.

روش بررسی

افرادی که جهت انجام اسپرموگرام و درمان ناباروری به مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر این‌سینا مراجعه کرده بودند و علت ناباروری در آنها ناشی از عامل زنانه بود، پس از اعلام رضایت برای شرکت در مطالعه، انتخاب شدند. نمونه اضافی مایع منی ۵ فرد دارای پارامترهای اسپرمی طبیعی (مطابق استانداردهای

مرحله‌ای انجام گرفت.
واکنش PCR با استفاده از cDNA نمونه‌های اسپرم 10X PCR buffer ۲/۵ μ l، طبیعی به صورت جدآگانه، ۱ μ l MgCl₂ (۲۵ mM/l)، ۱/۵ μ l (Roche Germany)، ۱ μ l Taq dNTP (۱۰ pM)، ۱ μ l پرایمر (۱۰ pM)، ۰/۲ آنزیم ۱۶/۸ μ l (Roche, Germany) polymerase و ۹۴ °C، انجام گرفت. نمونه‌های cDNA ابتدا در ۹۴ °C، انجام گرفت. نمونه‌های cDNA در ۳۷ °C به مدت ۵ دقیقه به صورت تک رشته در آمد و پرایمرها در مدت ۳۰ ثانیه در دمای T_a به DNA متصل شدند و به مدت ۳۰ ثانیه در هر سیکل و ۷ دقیقه در سیکلنهای طویل سازی^۳ انجام گرفت.

انجام PCR در روی ژل آگارز (Agarose LE, Roche, Germany) به مدت ۴۵ دقیقه با ولتاژ ۹۵ تحت الکتروفورز قرار گرفت و با اتیدیوم بر ماید رنگ‌آمیزی و سپس تحت تابش اشعه UV محل باندهای جداسازی شده آشکار شد.

جهت کنترل کیفی باندهای به دست آمده، پس از استخراج از ژل و انتقال به پلاسمید PGM5ZF در باکتری JM109، کلون و پس از تخلیص پلاسمید تعیین توالی باند انجام و با توالی موجود در بانک ژنی تطبیق

^۱ به مدت ۶۰ دقیقه در دمای ۴۲ °C جهت سنتز cDNA و ۱۰ دقیقه در ۹۵ °C جهت غیر فعال شدن آنزیم قرار داده شد.

برای کنترل کیفیت مراحل استخراج RNA و سنتز cDNA از ژن house keeping استفاده شد. سپس نمونه‌های حاوی رونوشت بتا اکتین^۲ استفاده شد. نمونه‌های مثبت برای انجام مراحل بعدی انتخاب شدند. برای انجام کنترل و صحت شناسایی رونوشتها از هر جفت پرایمر یک عدد به گونه‌ای طراحی شد که بر روی دو اگزون مجاور قرار گیرد، در این حالت باند مورد انتظار برای RNA کوچکتر از باند احتمالی ژنومیک خواهد بود (۲۸).

انجام PCR نمونه cDNA با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شد (جدول ۱)، با استفاده از بانک ژنی و BLAST (جدول ۱)، مربوط به ژن SYCP3 در واکنش PCR تکثیر شده و سپس متعاقب آن واکنش دوم PCR با استفاده از مخصوص PCR اول و پرایمرهای اختصاصی Nested انجام گرفت. با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای ژن‌های PRM1، PRM2، TSGA10 و DAZ و واکنش PCR یک

جدول ۱- توالی پرایمرهای استفاده شده در واکنش PCR نمونه‌های cDNA مایع منی افراد مبتلا به آرواسپرمی غیرانسدادی مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر این‌سینا

Target	Primer sequences	Band size	T_a (°C) [*]
β -actin	F: 5'-ccgcgagaagatgaccaggatcatg-3' R: 5'-cacccacactgtgcccatctacgt-3'	155bp	62
DAZ	F: 5'-gggtgttaccagaaggcaaa-3' R: 5'-gtgtttttgttagatacgggttc-3'	106bp	60
AKAP4	F1: 5'-agatgtctgtatattgtactgg-3' R1: 5'-tgtgttcattttctagacgttgg-3' F1: 5'-tgcgggtgtttcagtcagg-3'	542bp	57
SYCP3	R1: 5'-catattacttaggttcaaggtc-3' F2: 5'-aaatatgggtccctcegg-3' R2: 5'-tcttcaaaggatcatcg-3'	842bp	52
PRM1	F1: 5'-atgccaggatcacatgtgtcgca-3' R1: 5'-gtacctggggccggcagcacctcatgg-3'	132bp	62
PRM2	F1: 5'-agggggtcacatggactctgc-3' R1: 5'-gtcggccccggagcacgtcgagg-3'	184bp	62
TSGA10	F1: 5'-gggtgttaccagaaggcaaa-3' R1: 5'-gtgtttttgttagatacgggttc-3'	100bp	59


3- Double Distilled Water
4- Extension

1- Mouse Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase
2- β -actin

عنوان کنترل مثبت برای ژن‌های فوق الذکر یک باند در ناحیه ۱۵۵ نوکلئوتیدی مربوط به ژن β -actin، یک باند در ناحیه ۸۴۲ نوکلئوتیدی مربوط به ژن SYCP3، یک باند در ناحیه ۱۰۶ نوکلئوتیدی مربوط به ژن DAZ و ۵۴۲ bp داده شد (۲۹,۳۰).

نتایج

نتایج واکنش PCR در نمونه بافت بیضه طبیعی به



شکل ۱- بررسی بیان ژن‌های اختصاصی بیضه توسط RT-PCR با استفاده از total RNA مربوط به نمونه‌های مایع منی بیماران آزواسپرمی غیرانسدادی مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر این‌سیتا (شماره‌های ۱ الی ۴): (+) نمونه کنترل مثبت، (-) نمونه کنترل منفی.

(ب) PRM1 (ج) AKAP4 (د) DAZ (ه) TSGA10 (ن) PRM2
 β - actin (ن)

اسپرم با وجود پروتامینه شدن DNA و متراکم شدن هسته جهت آماده‌سازی برای انتقال به تخک، سنتز mRNA را به صورت فعال انجام می‌دهد. همچنین با توجه به اینکه در برخی تحقیقات اسپرم انسان به مدت بیش از ۱۷ روز در محیط مناسب خارج از بدن زنده نگهداری شده است (۳۴) و با توجه به نیمه عمر کوتاه mRNA و پروتئین‌های مورد نیاز جهت فعالیت‌های سلول، اسپرم بالغ باید توانایی تولید mRNA جدید و ترجمه این رونوشتها به پروتئین را داشته باشد.

Gur در سال ۲۰۰۶ ترجمه mRNA اسپرم توسط ریبوزوم‌های میتوکندریایی را گزارش کرد (۴). در سال ۲۰۰۸ توسط همین شخص نشان داده شد که اسپرم بالغ در مراحل پایانی بلوغ و قبل از انتقال به تخک با استفاده از ذخایر mRNA خود پروتئین سنتز می‌کند. وی نشان داد که سنتز پروتئین با بکارگیری ریبوزوم‌های میتوکندریایی و بدون دخالت سیستم رونویسی سیتوپلاسمی، صورت می‌گیرد. این پروتئینها یا جایگزینی برای پروتئین‌های تجزیه شده هستند و یا پروتئینهایی هستند که در فرآیندهای لازم برای قدرت باروری اسپرم شامل ظرفیت پذیری، افزایش شدید حرکت و واکنش آکروزومی اسپرم مورد نیاز می‌باشند (۳۵).

اخیراً نشان داده شده که مقداری از mRNA اسپرم در زمان لقاح به تخک منتقل شده تا در فاصله زمانی قبل از فعال شدن ژنوم جنینی با استفاده از سیستم تولید پروتئین سلول تخم بتواند به پروتئین تبدیل شود (۳۶). به نظر می‌رسد که رونوشتاهای موجود در اسپرم که زمانی تصور می‌شد بقایای حاصل از مراحل انتهایی اسپرماتوژنز هستند به طور فعال توسط اسپرم بالغ تولید شده و برای رشد جنین در مراحل اولیه نقش حیاتی داشته باشند. این یافته‌ها در زمینه انتقال هسته سوماتیکی در تکنولوژی کلونینگ اهمیت زیادی دارند (۱۳).

یک باند در ناحیه ۵۰۰ نوکلئوتیدی مربوط به ژن AKAP4 را نشان داد. باند مربوط به ژن PRM1 در ناحیه ۱۳۲bp و باند PRM2 در ناحیه ۱۸۴bp مشاهده شد. باند مربوط به ژن TSGA10 در ناحیه ۱۰۰bp مشاهده گردید.

ژن DAZ، PRM1، TSGA10، PRM2 و SYCP3 در نمونه‌های اسپرم بالغ و بافت بیضه بیان شدند. بیان ژن‌های AKAP4، SYCP3 در نمونه اسپرم بالغ دیده نشد؛ در حالیکه نمونه کنترل مثبت (بافت بیضه طبیعی) بیان ژن را نشان می‌دهد (شکل ۱).

نتایج کلونینگ و تعیین توالی نیز صحت توالی باند مشاهده شده را تایید کرد.

بحث

در گذشته تصور بر این بود که اسپرم بالغ از نظر رونویسی خاموش است؛ شواهد اخیر نشان می‌دهد که هسته اسپرم از آنچه تصور می‌شد عضو فعال‌تری می‌باشد. تحقیقات، حضور رونویسی فعل mRNA در اسپرم را تأیید می‌کنند (۱۹، ۳۱). مطالعات نشان داده که هسته اسپرم حاوی بخش‌های نوکلئوپروتامینی و نوکلئوھیستونی می‌باشد. قسمت‌های نوکلئوھیستونی فشرده‌گی کمتری داشته و حساس به نوکلئاز می‌باشند و احتمالاً در بیان ژن‌های مورد نیاز برای عملکرد اسپرم نقش ایفا می‌کنند (۳۲). امروزه می‌دانیم که بخشی از محتوای mRNA موجود در اسپرم بقایای ذخایر mRNA سنتز شده در مراحل انتهایی اسپرماتوژنز mRNA است که به اسپرم منتقل شده و بخش دیگر سنتز شده توسط سلول اسپرم می‌باشد (۱۰، ۱۹، ۳۳). سنتز mRNA اختصاصی در اسپرم بالغ با کروماتین مترکم شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بررسی مکانیسم رونویسی در اسپرم و نحوه عملکرد این رونوشتها در این سلول و در مراحل لقاح و تکوین اولیه جنین نیازمند تحقیقات مولکولی دقیق می‌باشد. سلول

اسپرم‌اتید به اسپرم بوده و رونوشت‌های موجود در اسپرم بالغ به صورت فعال پس از مرحله اسپرمیوژن‌ز تولید شده‌اند. چنانچه رونوشت مواردی در مراحل اولیه اسپرم‌اتوژن‌شامل اسپرم‌اتوگونی، اسپرم‌اتوسیت اولیه و ثانویه حضور نداشته باشد، اما در اسپرم بالغ حضور آنها تأیید شود می‌توان نتیجه گرفت که این ژن به طور فعال در مراحل پایانی اسپرم‌اتوژن‌بیان شده است.

از طرف دیگر حضور رونوشت پروتامینها (۱۶) در اسپرم بالغ که کروماتین آن متراکم شده است این سؤال را مطرح می‌کند که علت حضور آن چیست؟ آیا در مراحل اولیه لقاح نقش دارد؟ از طرفی در جنین نیز باید این پروتامینها از اطراف کروماتین اسپرم جدا شوند تا پیش‌هسته پدری تشکیل شود. دلیلی که می‌توان برای این حضور تصور نمود، تداوم پروتامینه شدن کروماتین اسپرم پس از بلوغ و رها شدن آن در لوله‌های سمینیفروس و مایع منی است؛ زیرا همانطور که قبلاً اشاره شد در اسپرم بالغ علاوه بر نواحی پروتامینه در کروماتین، نواحی هیستون دار نیز وجود دارند. احتمالاً این نواحی همان نواحی فعال برای نسخه‌برداری از DNA باشند که در صورت نیاز مکانیسم کنترل داخل سلول در مراحل مختلف این نواحی هیستون دار را با پروتامین جایگزین نمایند. تأیید این مطالب نیازمند انجام مطالعات روی کروماتین اسپرم می‌باشد. به طوریکه در مطالعه Wykes نشان داده شده که PRM1 و PRM2 در اسپرم به همان نسبتی است که در بیضه وجود دارد (PRM1<PRM2) (۳۸).

بنابراین به نظر می‌رسد که ژن‌های مختلف بر حسب نیاز سلول و به صورت انتخابی در مراحل مختلف بیان می‌شود و اسپرم بالغ نیز با بیان ژن‌های دخیل در بسته‌بندی و فشرده‌سازی و در نهایت آماده‌سازی

برخی گزارشها RNA اسپرم را به عنوان منبع مولکولی تحقیقات ناباروری معرفی کرده‌اند. طی سالیان گذشته RNA اسپرم به عنوان روش تشخیصی مناسب جهت ارزیابی موفقیت‌وازنکومی معرفی شده است.

حضور انواع رونوشت‌ها در مراحل مشخصی از اسپرم‌اتوژن‌نمایانگر فعالیت خاص این رونوشت‌ها و یا پروتئین حاصل از آنها در مقطع زمانی خاص می‌باشد. حضور رونوشت ژن‌های DAZ، PRM1، PRM2 و TSGA10 در اسپرم بالغ نمایانگر نقش فعال این رونوشت‌ها یا پروتئین آنها در عملکرد طبیعی اسپرم و احتمالاً در فعالیت‌های بعدی اسپرم طی مراحل لقاح و تکوین جنین می‌باشد. در حالیکه برخی ژنهای مانند SYCP3، AKAP4 که در مراحل ابتدایی اسپرم‌اتوژن، تقسیم میوز و شکل‌گیری فرم طبیعی اسپرم بالغ نقش دارند و بقایای رونوشت‌های آنها تجزیه شده و در اسپرم بالغ نیز بیان این ژنها وجود ندارد.

احتمال دیگری که حضور این گونه رونوشت‌ها در اسپرم مطرح شده بیان فعال و انتخابی این ژنهای در اسپرم بالغ می‌باشد؛ در حالیکه برخی محققین عقیده دارند که بیان ژن در اسپرم بالغ صورت نمی‌گیرد (۲۰، ۹، ۳۷). از طرف دیگر تحقیقات اخیر با استفاده از نمونه‌های بیضه دارای توقف^۱ در رده‌های مشخصی از اسپرم‌اتوژن مرحله بیان ژن‌های اختصاصی بیضه را تعیین کرده‌اند که ژن اختصاصی بافت بیضه از چه مرحله‌ای شروع به بیان کرده و در چه مرحله‌ای از اسپرم‌اتوژن بیان آن متوقف شده و عملکرد پروتئین حاصل از آن در چه مرحله‌ای بروز می‌کند. به عنوان مثال در مطالعه Arabi نشان داده شد که بیان ژن SYCP3 از مرحله اسپرم‌اتوسیت اولیه آغاز و در مرحله اسپرم‌اتید متوقف می‌شود (۲۱)، بنابراین نتایج حاصل از این مطالعه مبنی بر عدم حضور رونوشت‌های SYCP3 در اسپرم نشان‌دهنده عدم انتقال تمامی بقایای mRNA از

احتمالاً به دلیل اتمام عملکرد این رونوشتها و عدم نیاز اسپرم بالغ به این رونوشتها برای عملکردهای بعدی خود می‌باشد.

تحقیقات بیشتر روی RNA اسپرم بالغ روند رو به رشد استفاده از ابزارهای دقیق مولکولی جهت روش‌های تشخیصی را تسربیع می‌کند. این امر منجر به آگاهی از فرایند مولکولی لفاح در انسان و سایر پستانداران و نیز شناسایی علل مولکولی بسیاری از موارد ناباروی خواهد گردید که امروزه برای ما ناشناخته می‌باشد و در رده ناباروریها با علت نامشخص تقسیم‌بندی می‌شود.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان این مقاله از همکاری صمیمانه مدیر محترم مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن‌سینا، جناب آقای دکتر مدبری و کارشناسان حوزه پژوهش سرکار خانم سوادی شیرازی و سرکار خانم اصغری تشکر و قدردانی می‌نمایند.

سلول جهت انتقال ژنوم پدری به تخمک، نیاز خود را مرتفع می‌سازد.

نتیجه گیری

در مطالعه حاضر برای اولین بار نشان داده شد که ژن‌های DAZ و TSGA10 نه تنها در بیضه طبیعی بلکه در اسپرم بالغ انسان نیز بیان می‌شوند؛ که این امر آنها را به مارکرهای مولکولی مناسب جهت تعیین حضور اسپرم و بررسی وضعیت اسپرماتوژن در مردان نابارور، بدون نیاز به انجام عمل تهاجمی بیوپسی بیضه، تبدیل می‌کند. همچنین بیان ژن‌های PRM2 و PRM1 در اسپرم بالغ تأیید شد (۱۶).

بیان ژن‌های AKAP4، SYCP3 نیز برای اولین بار در اسپرم بالغ بررسی شد. نتایج نشان‌دهنده بیان این سه ژن در نمونه بیوپسی بیضه طبیعی و عدم بیان آنها در اسپرم بالغ انسان می‌باشد. مطالعات قبل نشان داده بود که رونوشت ژن SYCP3 در مرحله اسپرماتوسیت اولیه حضور دارد (۲۱)؛ اما RNA این ژن در اسپرم بالغ وجود نداشت. حذف این رونوشتها در مراحل پایانی

References

- Miller D, Ostermeier GC. Towards a better understanding of RNA carriage by ejaculate spermatozoa. *Hum Reprod Update*. 2006;12(6):757-67.
- Miller D. RNA in the ejaculate spermatozoon: a window into molecular events in spermatogenesis and a record of the unusual requirements of haploid gene expression and post-meiotic equilibration. *Mol Hum Reprod*. 1997;3(8):669-76.
- Badawy SZ, Shue F, Chohan K, Hearn B. Varicoceles and sperm nuclear fragmentation? *Fertil Steril*. 2006;86(4):1031.
- Gur Y, Breitbart H. Mammalian sperm translate nuclear encoded proteins by mitochondrial-type ribosomes. *Genes Dev*. 2006;20(4):411-6.
- Miller D, Briggs D, Snowden H, Hamlington J, Rollinson S, Lilford R, et al. A complex population of RNAs exists in human ejaculate spermatozoa: implications for understanding molecular aspects of spermiogenesis. *Gene*. 1999;237(2):385-92.
- Hecht NB, Williams JL. Synthesis of RNA by separated heads and tails from bovine spermatozoa. *Biol Reprod*. 1978;19(3):573-9.
- Pessot CA, Brito M, Figueroa J, Concha II, Yanez A, Burzio LO. Presence of RNA in the sperm nucleus. *Biochem Biophys Res Commun*. 1989;158(1):272-8.
- Kumar G, Patel D, Naz RK. c-MYC mRNA is present in human sperm cells. *Cell Mol Biol Res*. 1993;39(2):111-7.
- Miller D, Tang PZ, Skinner C, Lilford R. Differential RNA fingerprinting as a tool in the analysis of spermatozoal gene expression. *Hum Reprod*. 1994;9(5):864-9.
- Wykes SM, Miller D, Krawetz SA. Mammalian spermatozoal mRNAs: tools for the functional analysis of male gametes. *J Submicrosc Cytol Pathol*. 2000;32(1):77-81.
- Ostermeier GC, Dix DJ, Miller D, Khatri P, Krawetz SA. Spermatozoal RNA profiles of normal fertile men. *Lancet*. 2002;360(9335):772-7.

- 12- Miller D. Ensuring continuity of the paternal genome: potential roles for spermatozoal RNA in mammalian embryogenesis. *Soc Reprod Fertil Suppl.* 2007;65:373-89.
- 13- Ostermeier GC, Miller D, Huntriss JD, Diamond MP, Krawetz SA. Reproductive biology: delivering spermatozoan RNA to the oocyte. *Nature.* 2004;429(6988):154.
- 14- Miller D. Spermatozoal RNA as reservoir, marker and carrier of epigenetic information: implications for cloning. *Reprod Domest Anim.* 2007;42 Suppl 2:2-9.
- 15- Miller D, Ostermeier GC. Spermatozoal RNA: Why is it there and what does it do? *Gynecol Obstet Fertil.* 2006;34(9):840-6.
- 16- Caldwell KA, Handel MA. Protamine transcript sharing among postmeiotic spermatids. *Proc Natl Acad Sci USA.* 1991;88(6):2407-11.
- 17- Rassoulzadegan M, Grandjean V, Gounon P, Vincent S, Gillot I, Cuzin F. RNA-mediated non-mendelian inheritance of an epigenetic change in the mouse. *Nature.* 2006;441(7092):469-74.
- 18- SA OGaK. Spermatozoal RNA as a surrogate marker of paternal exposure. Boca Raton: CRC press 2006.
- 19- Lambard S, Galeraud-Denis I, Martin G, Levy R, Chocat A, Carreau S. Analysis and significance of mRNA in human ejaculated sperm from normozoospermic donors: relationship to sperm motility and capacitation. *Mol Hum Reprod.* 2004;10(7):535-41.
- 20- Parra MT, Viera A, Gomez R, Page J, Benavente R, Santos JL, et al. Involvement of the cohesin Rad21 and SCP3 in monopolar attachment of sister kinetochores during mouse meiosis I. *J Cell Sci.* 2004;117(Pt 7):1221-34.
- 21- Aarabi M, Modarressi MH, Soltanghorae H, Behjati R, Amirjannati N, Akhondi MM. Testicular expression of synaptonemal complex protein 3 (SYCP3) messenger ribonucleic acid in 110 patients with nonobstructive azoospermia. *Fertil Steril.* 2006;86(2):325-31.
- 22- Warchol JB, Augustyniak S, Stecewicz D, Jankowska A. Detection of DAZ mRNA distribution in human testis using reverse transcription in situ PCR technique (RT-ISPCR). *Folia Histochem Cytobiol.* 2001;39(2):117-8.
- 23- Menke DB, Mutter GL, Page DC. Expression of DAZ, an azoospermia factor candidate, in human spermatogonia. *Am J Hum Genet.* 1997;60(1):237-41.
- 24- Huang Z, Somanath PR, Chakrabarti R, Eddy EM, Vijayaraghavan S. Changes in intracellular distribution and activity of protein phosphatase PP1gamma2 and its regulating proteins in spermatozoa lacking AKAP4. *Biol Reprod.* 2005;72(2):384-92.
- 25- Mobasher MB, Modarressi MH, Shabani M, Asgarian H, Sharifian RA, Vossough P, et al. Expression of the testis-specific gene, TSGA10, in Iranian patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL). *Leuk Res.* 2006;30(7):883-9.
- 26- Behnam B, Modarressi MH, Conti V, Taylor KE, Puliti A, Wolfe J. Expression of Tsga10 sperm tail protein in embryogenesis and neural development: from cilium to cell division. *Biochem Biophys Res Commun.* 2006;344(4):1102-10.
- 27- Jane Christopher-Henningsa, , Matthew Dammena, Eric Nelsona, Raymond Rowlandb and Richard Oberstb Comparison of RNA extraction methods for the detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus from boar semen journal of virological methods. 2006;136(1-2):248-53.
- 28- Ostermeier GC, Goodrich RJ, Moldenhauer JS, Diamond MP, Krawetz SA. A suite of novel human spermatozoal RNAs. *Journal of andrology.* 2005;26(1):70-4.
- 29- Joseph Sambrook DWR. Molecular Cloning: A Laboratory Manual CSHL Press 2001.
- 30- Marchuk D, Drumm M, Saulino A, Collins FS. Construction of T-vectors, a rapid and general system for direct cloning of unmodified PCR products. *Nucleic Acids Res.* 1991;19(5):1154.
- 31- Zhang H, Denhard LA, Zhou H, Liu LH, Lan ZJ. 0610009K11Rik, a testis-specific and germ cell nuclear receptor-interacting protein. *Biochem Biophys Res Commun.* 2008;366(4):898-904.
- 32- Galeraud-Denis I, Lambard S, Carreau S. Relationship between chromatin organization, mRNAs profile and human male gamete quality. *Asian J Androl.* 2007;9 (5):587-92.
- 33- Wang H, Zhou Z, Xu M, Li J, Xiao J, Xu ZY, et al. A spermatogenesis-related gene expression profile in human spermatozoa and its potential clinical applications. *J Mol Med.* 2004;82(5):317-24.
- 34- Akhondi MA, Chapple C, Moore HD. Prolonged survival of human spermatozoa when co-incubated with epididymal cell cultures .*Hum Reprod.* 1997;12 (3):514-22.
- 35- Gur Y, Breitbart H. Protein synthesis in sperm: Dialog between mitochondria and cytoplasm. *Mol Cell Endocrinol.* 2008;282(1-2):45-55.
- 36- Boerke A, Dieleman SJ, Gadella BM. A possible role for sperm RNA in early embryo development. *Theriogenology.* 2007;68 Suppl 1:S147-55.
- 37- Miller D, Ostermeier GC, Krawetz SA. The controversy, potential and roles of spermatozoal RNA. *Trends Mol Med.* 2005;11(4):156-63.
- 38- Wykes SM, Visscher DW, Krawetz SA. Haploid transcripts persist in mature human spermatozoa. *Mol Hum Reprod.* 1997;3(1):15-9.